Klucz i wskazówki dla nauczyciela

Logarytm pierwiastka

Karty są odrębnymi propozycjami pracy. Poziomy konkursowe oznaczają autorską ocenę trudności, nie cytaty z konkretnego konkursu.

Zadanie źródłowe / rozwiązanie

Podstawa logarytmu to 2^3, a pierwiastek to $2^{1/5}$. Szukamy wykładnika t spełniającego $(2^3)^t = 2^{1/5}$. Zatem $3t = \frac{1}{5}$ i $t = \frac{1}{15}$. Odpowiedź: A.

Odpowiedź: A

1 / Od schematu do wyzwania

1. Oblicz $\log_3 27 - \log_3 3$.

Odpowiedź: 2

Wartości logarytmów to 3 i 1.

2. Oblicz $\log_9 \sqrt{3}$.

Odpowiedź: $\frac{1}{4}$

Podstawę zapisujemy z wykładnikiem 2, argument z wykładnikiem 1/2. Iloraz wykładników to 1/4.

3. Rozwiąż $\log_3(x-2) = 2$.

Odpowiedź: 11

Dziedzina: $x > 2$. Równanie daje $x - 2 = 9$, zatem $x = 11$; warunek jest spełniony.

4. Rozwiąż $\log_3 x + \log_3(x-2) = 1$.

Odpowiedź: 3

Dziedzina: $x > 2$. Iloczyn argumentów wynosi 3, więc $x^2 - 2x - 3 = 0$, czyli $(x-3)(x+1) = 0$. Tylko $x = 3$ należy do dziedziny.

5. Dla $a, b, c > 0$, różnych od 1, wykaż $\log_a b \cdot \log_b c \cdot \log_c a = 1$.

Odpowiedź: 1

Zapisz $u = \log_a b$, $v = \log_b c$, $w = \log_c a$. Wtedy $b = a^u$, $c = b^v = a^{uv}$ oraz $a = c^w = a^{uvw}$. Ponieważ a≠1, mamy uvw=1.

6. Znajdź wszystkie całkowite pary $2 \le u, v \le 9$, dla których $\log_u v + \log_v u = \frac{5}{2}$. Uzasadnij.

Odpowiedź: $\{(2,4), (3,9), (4,2), (9,3)\}$

Niech $t = \log_u v > 0$. Wtedy $\log_v u = 1/t$. Równanie $t + 1/t = 5/2$ daje $2t^2 - 5t + 2 = 0$, więc $t = 2$ lub $t = 1/2$. Oznacza to $v = u^2$ albo $u = v^2$. Mniejsza liczba może być dowolną całkowitą od 2 do 3; większa jest jej kwadratem. To wszystkie pary podane w odpowiedzi.

2 / Małe kroki

1. Oblicz $\log_3 9$.

Odpowiedź: 2

$3^2 = 9$.

2. Oblicz $\log_3 1$.

Odpowiedź: 0

Każda dodatnia podstawa różna od 1 do potęgi 0 daje 1.

Zadanie 3 jest oryginałem CKE; odpowiedź i rozwiązanie znajdują się na początku klucza.

3 / Rozgrzewka / 4 grupy

Każdy numer: 1 punkt; przy kilku odpowiedziach punkt za komplet poprawnych odpowiedzi. Czas: 5 minut.

Grupa A

1. Oblicz $\log_3 3$.

Odpowiedź: 1

Podstawa do potęgi 1 jest równa sobie.

2. Oblicz $\log_3 9$.

Odpowiedź: 2

$3^2 = 9$.

3. Oblicz $\log_3 1$.

Odpowiedź: 0

Argument 1 odpowiada wykładnikowi 0.

4. Oblicz $\log_3(1/3)$.

Odpowiedź: -1

$3^{-1} = 1/3$.

Grupa B

1. Oblicz $\log_4 4$.

Odpowiedź: 1

Podstawa do potęgi 1 jest równa sobie.

2. Oblicz $\log_4 16$.

Odpowiedź: 2

$4^2 = 16$.

3. Oblicz $\log_4 1$.

Odpowiedź: 0

Argument 1 odpowiada wykładnikowi 0.

4. Oblicz $\log_4(1/4)$.

Odpowiedź: -1

$4^{-1} = 1/4$.

Grupa C

1. Oblicz $\log_5 5$.

Odpowiedź: 1

Podstawa do potęgi 1 jest równa sobie.

2. Oblicz $\log_5 25$.

Odpowiedź: 2

$5^2 = 25$.

3. Oblicz $\log_5 1$.

Odpowiedź: 0

Argument 1 odpowiada wykładnikowi 0.

4. Oblicz $\log_5(1/5)$.

Odpowiedź: -1

$5^{-1} = 1/5$.

Grupa D

1. Oblicz $\log_6 6$.

Odpowiedź: 1

Podstawa do potęgi 1 jest równa sobie.

2. Oblicz $\log_6 36$.

Odpowiedź: 2

$6^2 = 36$.

3. Oblicz $\log_6 1$.

Odpowiedź: 0

Argument 1 odpowiada wykładnikowi 0.

4. Oblicz $\log_6(1/6)$.

Odpowiedź: -1

$6^{-1} = 1/6$.

4 / Znajdź błąd / 2 grupy

Po 1 punkcie za wskazanie błędu i 1 za poprawę z uzasadnieniem: 6 punktów na grupę.

Grupa A

1. Obliczano $\log_3 1$.

Odpowiedź: 0

Logarytm jest wykładnikiem. Jedynka powstaje przy wykładniku 0.

2. Upraszczano $\log_3 x + \log_3 y$ dla x,y>0.

Odpowiedź: $\log_3(xy)$

Suma logarytmów jest logarytmem iloczynu argumentów.

3. Rozwiązywano $\log_3 x = 2$.

Odpowiedź: $x = 9$

Z definicji logarytmu x jest kwadratem podstawy, nie jej podwojeniem.

Grupa B

1. Obliczano $\log_4 1$.

Odpowiedź: 0

Logarytm jest wykładnikiem. Jedynka powstaje przy wykładniku 0.

2. Upraszczano $\log_4 x + \log_4 y$ dla x,y>0.

Odpowiedź: $\log_4(xy)$

Suma logarytmów jest logarytmem iloczynu argumentów.

3. Rozwiązywano $\log_4 x = 2$.

Odpowiedź: $x = 16$

Z definicji logarytmu x jest kwadratem podstawy, nie jej podwojeniem.

5 / Matematyka w świecie

1. Skala mapy cyfrowej ma poziom $L = \log_2 z$. Dla powiększenia $z = 2^4$ oblicz L.

Odpowiedź: 4

Logarytm odczytuje wykładnik potęgi 2.

2. W modelu firma potraja sprzedaż co rok. Po ilu latach sprzedaż wzrośnie 3^2 razy?

Odpowiedź: 2

$3^t = 3^2$, więc $t = 2$.

3. Czujnik używa umownej skali $S = \log_{10} I$. Odczyt zmalał z 4 do 2. Ile razy zmalało I?

Odpowiedź: 100

Iloraz wartości to $10^4/10^2 = 10^2 = 100$.

4. Zadanie odwrócone: $\log_3 I = 2$. Odtwórz dodatnie I.

Odpowiedź: 9

Z definicji logarytmu $I = 3^2 = 9$.